

Инсектициды и акарициды, применимые против вредителей смородины

Вредитель	Фаза	Название препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
Биопрепараты			
Крыжовниковая огневка	Вегетация (с интервалом 7-8 дней)	Лепидоцид, П	5 (2)
		Лепидоцид, СК	5 (2)
Клещи	Вегетация	Фитоверм, КЭ	3 (2)
Клещи, тли	Вегетация	Биокилл, КЭ	3 (2)
Химические препараты			
Клещи	Вегетация	МатринБио, ВР	3 (3)
	Бутонизация	Алиот, КЭ	40 (1)
Тли	Вегетация	Батрайдер, СК	30 (1)
		Герольд, ВСК	30 (1)
		Фуфанон-Нова, ВЭ	20 (2)
	Перед цветением	Биотлин, ВРК	60 (1)
		Биотлин Бау, ВР	7 (1)
		Танрек, ВРК	7 (1)
		Инсектор, КС	60 (1)
Бутонизация	Инсектор Супра, КС	60 (1)	
	Кинмикс, КЭ	20 (2)	
	До и после цветения	Антитлин, П	20 (2)
Табазол, П		20 (2)	
Табачная пыль, П		20 (2)	
Зимующие стадии тлей	До распускания почек весной (при температуре не ниже +4°С)	Профилактин Лайт, ВЭ Препарат 30 Плюс Профилактин Био, ВЭ	- (1)
Стелянницы, тли	До цветения и после сбора урожая	Искра, ТАБ	60 (2)
Огневки, тли	Вегетация	Инта-Ц-М, ТАБ	20 (2)
		Карбоцин, ТАБ	20 (2)